

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: PERAL

354 AD

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Turbinado-aplastada o maliforme. Cuello muy alto y corto, poco acusado o sin cuello. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno con tendencia a pentagonal.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde muy irregular, ondulado o mamelonado. **Pedúnculo:** Longitud y grosor medianos. Fuerte, ligeramente engrosado en ambos extremos, rara vez semi-carnoso en la base. Ruginoso con lenticelas claras. Generalmente recto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo, bien incrustado en el fruto.

Cavidad del ojo: Amplia, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado. Pared interior surcada. **Ojo:** Mediano o pequeño. Generalmente cerrado, a veces semi-cerrado. Sépalos carnosos o coriáceos, amarillentos, convergentes con las puntas rizadas hacia fuera, en algunos frutos uno o más sépalos levantados, entreabriendo el ojo.

Piel: Lisa, fina, brillante o mate, a veces untuosa. **Color:** Amarillo verdoso pasando a amarillo pajizo o dorado, sin chapa o con chapa muy ligera levemente sonrosada. Punteado fino, ruginoso, con aureola verdosa o amarillenta. Zona ruginosa, no uniforme, lisa o semi-ruda formando maraña desde la base del pedúnculo, en general poco extensa; en algunos casos en la cavidad del ojo se forman círculos concéntricos también ruginosos.

Tubo del cáliz: Mediano, en embudo con conducto corto, bastante ancho. Pistilos unidos y carnosos, llenando el conducto.

Corazón: Muy pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, amplio y relleno. Celdillas pequeñas situadas muy altas.

Semillas: Pequeñas, elípticas o semi-globosas. Punto de inserción muy oblicuo, amarillento. Color castaño rojizo no uniforme.

Carne: Blanca. Muy fina, fundente, muy acuosa. **Sabor:** Dulce, aromático, alimonado. Estupendo.

Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

